



NEU

Rapid STAT®

Rapid STAT ist ein **revolutionärer point of collection Test** für Speichel-, Oberflächenwisch- und Reinstofftestungen. Rapid STAT® verbindet die **Einfachheit** eines Speichel-, Wisch- oder Reinstofftests mit der **Sensitivität, Genauigkeit und Präzision** eines Labortests, der die Ergebnisse in **6-13 Minuten** liefert.



AMP

Amphetamine 25 ng/ml

BZO

Benzodiazepine 10 ng/ml

COC

Kokain 10 ng/ml

MTD

Methadon 15 ng/ml

MET • MDMA

Methamphetamine 25 ng/ml •
Ecstasy 50 ng/ml

OPI

Opiate 10 ng/ml

THC

Marihuana 15 ng/ml

FLEXIBILITÄT

- Nachweis von 7 Drogen möglich
- 2 bis 7 Drogen pro Test - vielfältige Konfigurationen
- Als Speichel-, Wisch- oder Reinstofftest einsetzbar

BEDIENERFREUNDLICH

- Einfach zu bedienen durch das 1-Hand-Clip-System
- Jede Probenentnahme kann überwacht werden
- Toilette wird nicht benötigt
- Probenentnahme in nur 30 Sekunden
- Erhöhter Speichelfluss durch innovatives Geruchsfeld
- Kein Eingriff in die Intimsphäre
- Keine manipulierten Proben
- **Ergebnisse 6-13 Minuten**
- Schnelle Ergebnisse erlauben richtige Entscheidungen

EIGENSCHAFTEN

- Jeder Teststreifen hat eine eingebaute Verfahrenskontrolle
- Kolloid Gold Technologie = höhere Sensitivität, Genauigkeit & Präzision
- Auf Kreuzreaktion gegen die häufigsten herkömmlichen Drogen und andere Substanzen getestet
- Weist THC direkt (kein Metabolit) nach

SCHULUNG/SERVICE

- Schulung vor Ort
- Video Training auf DVD
- Telefonischer technischer Support

SAMHSA bestätigt: "Die einzige Möglichkeit, Marihuana nachzuweisen ist durch die Originalsubstanz (THC) im Speichel...."



Minimum-Kriterien für die richtige Wahl des Speichel-Drogentests

Rapid STAT® !

- 1. Der Test soll alle von SAMHSA vorgeschlagenen Drogen nachweisen.**

Die Substance Abuse Mental Health Services Administration (SAMHSA) hat vorgegebene Richtlinien veröffentlicht, die besagen, dass Speicheltests folgende Drogen nachweisen sollen: Amphetamine, Methamphetamine, MDMA, Kokain, Opiate, PCP und THC.
- 2. Nachweis von Marihuana**

Viele der auf dem Markt erhältlichen Tests sind ausgelegt, THC Metaboliten (THC-COOH) nachzuweisen. Studien haben jedoch ergeben, dass bei Verwendung von Marihuana nur die im Speichel befindlichen restlichen Originalsubstanzen des Marihuanas nachgewiesen werden können. Deswegen ist der direkte Nachweis von THC gefordert.
- 3. Sensitivität / Nachweisgrenzen**

In Speichel sind Drogen in viel geringerer Konzentration vorhanden als in Urin. Nehmen Sie einen Speicheltest mit kleinen Nachweisgrenzen um eine sichere Identifikation von Drogen im Speichel zu erhalten.
- 4. Einfache, schnelle Aufnahme der Probe**

Die Aufnahme der Speichelprobe soll einfach sein und nicht mehr als wenige Minuten dauern.
- 5. Probenmengenindikator**

Eine unzureichende Probenmenge ist der Schlüsselfaktor für das Scheitern von Speicheltesten. Ein Probenmengenindikator kann bei der Probenentnahme sicherstellen, dass genau die richtige Menge an Speichel von jedem Probanden und zu jeder Zeit aufgenommen wird, was die Leistungsmerkmale des Produkts optimiert.
- 6. Gleiche Probe für den Bestätigungstest**

Das Aufnahmeinstrument sollte die Möglichkeit einer aufgeteilten Probe bieten, so dass dieselbe Probe, falls notwendig, zu Bestätigungszwecken verwendet werden kann.
- 7. Schulung und Support**

Speicheltestungen sind relativ neu, daher sollte vom Hersteller eine ausführliche Schulung angeboten werden. Laufender technischer Support ist wichtig, um ein effizientes Drogentestprogramm aufrecht zu erhalten. Ein Hersteller sollte beides zur Verfügung stellen: Schulung und Support.